

# Temática: BOTÂNICA

## Escola Bosque do Bailique




### Observações de sementes

Nome da Planta	Junho		Julho		Agosto	
	Nº S	F %	Nº S	F %	Nº S	F %
Capurana	13	23	0	0	0	0
Cortiça	6	11	0	0	0	0
Verônica	5	9	5	4	0	0
Buçu	4	7	16	12	0	0
Anani	4	7	13	9	0	0
Tabereba	4	7	4	3	1	2
Ucuuba	3	5	22	16	0	0
Murumuru	3	5	11	8	0	0
Aninga	3	5	11	8	0	0
Aturia	3	5	3	2	0	0
Urucuri	3	5	2	1	0	0
Açaí	2	4	0	0	0	0
Seringa	1	2	4	3	0	0
Pracaxi	1	2	3	2	0	0
Balão de São João	1	2	0	0	2	4
Facãozeiro	1	2	0	0	0	0
Tento	0	0	0	0	10	20
Algodão	0	0	0	0	9	18
Olho de andorinha	0	0	0	0	16	12
Cebola brava	0	0	0	0	4	8
Cortiça	0	0	0	0	10	7
Anajá	0	0	0	0	2	4
Bongodolo brabo	0	0	0	0	4	3
Inga brabo	0	0	0	0	1	2
Coquinho verde	0	0	0	0	1	2
Xirona	0	0	0	0	2	1
Pracuuba	0	0	0	0	2	1
Olho de boi	0	0	0	0	1	1
Maracujá de urubu	0	0	0	0	1	1
Mãe de azeite	0	0	0	0	2	1
Fava	0	0	0	0	1	1
Cuinha verde	0	0	0	0	1	1
Castanha braba	0	0	0	0	1	1
Buriti	0	0	0	0	1	1
Andiroba	0	0	0	0	2	1

### Observação de Fenofase

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
Escola Bosque	Açaí								
	Bacaba								
Escola Bosque	Urucuri								
Escola Bosque	Murumuru								

Escola Bosque	Pau Mulato	Flor							
		Fruto							
	Anani	Flor							
		Fruto							
	Taperebá	Flor							
		Fruto							
	Seringa	Flor							
		Fruto							
	Pracaxi	Flor							
		Fruto							
Escola Bosque	Acapurana	Flor							
		Fruto							




**Açaí (*Euterpe oleracea* Mart.)**  
 Palmeira crescendo em touceiras chegando a atingir até 35 metros de altura. O caule é liso, sustentando no ápice um capitel de 12-14 folhas. Fruto arredondado e escuro. É abundante no Amapá, ocorrendo no estuário amazônico em regiões de várzea, igapó e campos naturais. Importante na dieta alimentar da população ribeirinha.



**Andiroba (*Carapa guianensis* Aubl.)**



**Jenipapo (*Genipa americana* L.)**



**Pracuúba (*Mora paraensis* (Ducke) Ducke)**