

Temática: BOTÂNICA

Jaburuzinho




Observação de sementes

Nome da Planta	Janeiro		Fevereiro		Abril	
	Nº S	F%	Nº S	F%	Nº S	F%
Aturiá	2	18	11	34	20	18
Verônica	2	18	6	19	7	6
Açaí	2	18	1	3	3	3
Taperebá	1	9	5	16	9	8
Siriuba	1	9	2	6	6	6
Mututi	1	9	0	0	19	17
Murumuru	1	9	0	0	2	2
Marajá	1	9	0	0	0	0
Buçu	0	0	2	6	6	6
Olho de Boi	0	0	1	3	2	2
Buriti	0	0	1	3	2	2
Facão	0	0	1	3	1	1
Carrapato	0	0	1	3	0	0
Borboleta	0	0	1	3	0	0
Aninga	0	0	0	0	12	11
Ucuuba	0	0	0	0	4	4
Cacau do Mato	0	0	0	0	4	4
Seringueira	0	0	0	0	3	3
Borboleta	0	0	0	0	3	3
Anani	0	0	0	0	2	2
Pracaxi	0	0	0	0	1	1
Maracuja Pretinho	0	0	0	0	1	1
Macrolobium	0	0	0	0	1	1
Jacitaria	0	0	0	0	1	1

Observação Fenológicas


Jaburuzinho			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
			Açaí	Espata						
	Flor									
	Fruto									
Coco	Espata									
	Flor									
	Fruto									

Jaburuzinho			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
			Jambo	Flor						
	Fruto									
Manga	Flor									
	Fruto									
Goiaba	Flor									
	Fruto									
Siriúba	Flor									
	Fruto									
Inga	Flor									
	Fruto									
Limão	Flor									
	Fruto									
Fruta Pão	Flor									
	Fruto									
Urucu	Flor									
	Fruto									



Inga (*Inga edulis* Mart.) Árvore de porte mediano, com cerca de 15 metros de altura. Tronco bastante ramificado. Folhas compostas, aladas. Flor branca. Frutos compridos em forma de vagem de com verde-oliva. Semente revestida por uma polpa branca comestível.

Açaí (*Euterpe oleracea* Mart.) Palmeira crescendo em touceiras chegando a atingir até 35 metros de altura. O caule é liso, sustentando no ápice um capitel de 12-14 folhas. Fruto arredondado e escuro. E abundante no estuário amazônico em regiões de várzea, igapó e campos naturais. Importante na dieta alimentar da população ribeirinha.



Fruta Pão (*Artocarpus altilis* (Sol. Ex Park.) Fosb.) Árvore com cerca de 15 metros de altura. Tronco pouco ramificado com cicatrizes deixadas pelas folhas. Folhas grandes, com limbo recortado. Látex branco viscoso. O Fruta Pão é originária das ilhas do sul do Pacífico, espalhando-se pelas regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo.



Buriti (*Mauritia flexuosa* L.) Palmeira robusta, solitária, atingindo alturas entorno de 30 metros. Caule cilíndrico sustentando na ápice cerca de 20 folhas em forma de leque. Fruto globoso formado por escamas de coloração avermelhada. Juntamente com o açaí é a palmeira mais abundante no estuário amazônico, ocorrendo nas várzeas e igapós. Inúmeras são as utilidades da palmeira como: vinho, doces, artesanatos, etc...